

Kepenų funkcijos stebėjimo planas skiriant agomelatiną

Patvirtinta indikacija: didžiosios depresijos epizodų gydymas suaugusiesiems

25 mg

Pradedant vartoti po 25 mg

ALT.....V/l

AST.....V/l

3 savaitė

ALT.....V/l

AST.....V/l

6 savaitė

ALT.....V/l

AST.....V/l

12 savaitė

ALT.....V/l

AST.....V/l

24 savaitė

ALT.....V/l

AST.....V/l

Jei yra klinikinių indikacijų, atlikite tyrimą bet koku metu.

Jei dozė padidinama iki **50 mg**, stebėjimo planą pradėkite vykdyti iš naujo.

Pradedant vartoti po 50 mg

ALT.....V/l

AST.....V/l

3 savaitė

ALT.....V/l

AST.....V/l

6 savaitė

ALT.....V/l

AST.....V/l

12 savaitė

ALT.....V/l

AST.....V/l

24 savaitė

ALT.....V/l

AST.....V/l

Jei yra klinikinių indikacijų, atlikite tyrimą bet koku metu.

Paciento vardas ir pavardė: _____

Plano vykdymo pradžios data: _____

Bet kokie galimi kepenų pažeidimo požymiai ar simptomai*

Serumo transaminazių (ALT, AST) aktyvumas

ALT ir (arba) AST
> 3 kartus viršija
VNR**

Padidėjęs
ALT ir (arba) AST aktyvumas
≤ 3 kartus viršija VNR

Normalus

Bet kokie galimi kepenų pažeidimo požymiai ar simptomai*

Kepenų pažeidimo simptomų ar požymių nėra
Pakartokite kepenų funkcijos tyrimus per 48 valandas

ALT ir (arba) AST
> 3 kartus viršija VNR

ALT ir (arba) AST
≤ 3 kartus viršija VNR

Nutraukti gydymą

- Reikia atlikti kepenų funkcijos tyrimus (įskaitant transaminazių)

Nutraukti gydymą

- Reguliariai kartoti kepenų funkcijos tyrimus, kol transaminazių aktyvumas kraujo serume vėl bus normalus

Tęsti gydymą

- Vadovaukitės kepenų funkcijos tyrimų planu

* Pvz., kaip tamsios spalvos šlapimas, šviesios spalvos išmatos, geltona oda ar akys, skausmas viršutinėje dešinėje pilvo dalyje, ilgai išliekantis naujai pasireiškęs ir nepaaiškinamas nuovargis. ** VNR – viršutinė normos riba